

n	LAVORAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	RINVASO												
2	ANNAFFIATURA												
3	CONCIMAZIONE												
4	POTATURA GERMOGLI												
5	POTATURA RAMI												
6	APPLICAZIONE FILO												
7	ESPOSIZIONE												
8	DISINFEZIONE												
9	DEFOGLIAZIONE												
10	RIPRODUZIONE												

LEGENDA

TAGLIO		SISTEMAZIONE IN INTERNO		TERRICCIO	
OMBRA TUTTO IL GIORNO		PREVENZIONE CONTRO RAGNETTO ROSSO		POMICE O AKADAMA	60 %
SOLE MATTINO OMBRA POMERIGGIO		PREVENZIONE CONTRO AFIDI E PIDOCCHI		UNIVERSALE	40 %
SOLE TUTTO IL GIORNO		PREVENZIONE CONTRO COCCINIGLIA		KANUMA	
ANNAFFIATURA SCARSA		PREVENZIONE CONTRO MUFFE	M	TORBA	
ANNAFFIATURA REGOLARE		RINVASO		SABBIA	
ANNAFFIATURA ABBONDANTE		RIPRODUZIONE PER MARGOTTA	AA	PER ACIDOFILE	
CONCIMAZIONE		RIPRODUZIONE PER SEME		COMPOSTO DI FOGLIE	
APPLICAZIONE FILO		RIPRODUZIONE PER TALEA		LAPILLO	

NOTE

1	Il rinvaso va effettuato mediamente ogni due-tre anni.
2	Non fare mai asciugare completamente il terreno, ma non esagerare nell'innaffiatura.
3	Dopo il rinvaso, aspettare 20 giorni prima di concimare. Usare concime a lenta cessione in tarda primavera, mentre in autunno più potassio e fosforo. Non esagerare mai con le concimazioni se la pianta è già in vaso ed è già formata.
4	Lasciare un paio di gemme su ogni rametto. Tagliare per mantenere la forma.
5	Potatura dei rami alla comparsa dei primi germogli. Dopo il taglio è necessario spargere sulle ferite il mastice cicatrizzante.
6	Il filo non dà particolari problemi, ma controllare frequentemente che non incida.
7	Pianta da esterno, ma proteggere dalle gelate nei mesi freddi, riponendola in serra fredda o in luoghi ove la temperatura non scende sotto lo zero. In estate gradisce il sole diretto ad esclusione dei mesi caldi.
8	Pianta attaccabile da afidi, cocciniglie e ragnetto rosso, prevenire con prodotti specifici nei periodi sopraindicati.
9	Defogliare la pianta in più riprese a distanza di una settimana, eliminando le foglie più grandi.
10	Si riproduce per margotta e talea.