


**Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio**  
**(Prof. G. Naletto)**  
**Seconda Prova di Accertamento di Fisica 1 - Padova, 12 Aprile 2003**

Cognome ..... Nome ..... Matricola .....

**Problema 1**



Un corpo rigido è costituito da una sbarretta di massa trascurabile e lunghezza  $d = 2R = 0.6 \text{ m}$  con collegati ai suoi due estremi un punto materiale di massa  $m$  ed un guscio sferico di massa  $M = 3m$  e raggio  $R$ . Il corpo ruota attorno ad un asse fisso privo di attrito perpendicolare alla sbarretta e passante per il suo estremo tangente al guscio sferico con velocità angolare  $\omega_1$ . Sapendo che il momento d'inerzia del corpo rispetto all'asse di rotazione è pari a  $I_1 = 2 \text{ kg m}^2$ , calcolare:


a) la massa  $m$  del punto materiale.

Successivamente, grazie all'azione delle sole forze interne, la sbarretta trasla rispetto all'asse di rotazione finché quest'ultimo si trova esattamente a metà sbarretta. In questa nuova situazione, la velocità angolare del sistema è pari a  $\omega_2 = 4 \text{ rad/s}$ . Calcolare:

b) la velocità angolare iniziale  $\omega_1$  di rotazione del corpo;

c) il lavoro  $W$  (con segno) compiuto dalle forze interne.

**Problema 2**



Un filo inestensibile e di massa trascurabile è avvolto attorno ad una puleggia di raggio  $r = 0.2 \text{ m}$  e massa trascurabile. La puleggia è solidale e coassiale ad un disco di raggio  $R = 2r$  e massa  $m = 5 \text{ kg}$ . Il sistema può ruotare attorno all'asse di simmetria, soggetto ad un momento di attrito costante pari a  $M_{attr}$ .


Un corpo di massa  $m_c = m/10$  è collegato all'estremo libero del filo ed è soggetto all'azione della forza peso. Inizialmente il sistema è fermo, poi il corpo è lasciato libero di cadere.

Sapendo che la tensione presente sul filo è pari a  $T = 2 \text{ N}$ , calcolare:

a) il valore del modulo del momento di attrito  $M_{attr}$ ;

b) la distanza  $\ell$  di cui è sceso il corpo quando ha raggiunto la velocità  $v = 2 \text{ m/s}$ .

**Problema 3**




Due sbarrette rigide A e B uguali di lunghezza  $\ell$  e di massa  $m = 4 \text{ kg}$  si stanno muovendo su un piano orizzontale privo di attriti rispettivamente con velocità costanti pari a  $v_A = 0.4 \text{ m/s}$  e  $v_B = -0.8 \text{ m/s}$ . Durante il moto, le due sbarrette entrano in contatto ad un loro estremo e rimangono attaccate formando un'unica sbarretta rigida di lunghezza  $2\ell$ . Calcolare:

a) la velocità  $v_{CM}$  (modulo, direzione e verso) del centro di massa del corpo dopo l'urto;

b) la lunghezza  $\ell$  delle sbarrette, sapendo che il modulo della velocità angolare del corpo dopo l'urto è pari a  $\omega = 0.8 \text{ rad/s}$ ;

c) l'energia  $E_{diss}$  dissipata nell'urto.

**Problema 4**



$n = 4$  moli di gas monoatomico inizialmente nello stato A compiono il ciclo mostrato in figura. Il ciclo è costituito da una trasformazione adiabatica reversibile AB ( $p_B = 1.2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ ,  $V_B = 0.08 \text{ m}^3$ ), seguita da una trasformazione isoterma reversibile BC ed infine da una trasformazione isocora CA. La pressione del gas in C è pari a  $p_C = 1.5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ . Calcolare:

a) la temperatura  $T_C$  del gas in C;

b) la variazione di energia interna  $\Delta U_{CA}$  del gas nella trasformazione CA;

c) il lavoro  $W_{ABC}$  compiuto dal gas nelle trasformazioni AB+BC.

## Soluzioni

### Problema 1

- a)  $I_1 = \left( \frac{2}{3} 3mR^2 + 3mR^2 \right) + m \cdot 4R^2 = 9mR^2 \Rightarrow m = \frac{I_1}{9R^2} = 2.47 \text{ kg}$
- b)  $L = \text{cost} \Rightarrow I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2; \quad I_2 = \left( \frac{2}{3} 3mR^2 + 3m \cdot 4R^2 \right) + mR^2 = 15mR^2 \Rightarrow$   
 $\omega_1 = \frac{I_2}{I_1} \omega_2 = \frac{15mR^2}{9mR^2} \omega_2 = \frac{15}{9} \omega_2 = 6.67 \text{ rad/s}$
- c)  $W = \Delta E_k = \frac{1}{2} I_2 \omega_2^2 - \frac{1}{2} I_1 \omega_1^2 = \frac{1}{2} \left[ 15mR^2 \omega_2^2 - 9mR^2 \left( \frac{15}{9} \omega_2 \right)^2 \right] = -5mR^2 \omega_2^2 = -17.8 \text{ J}$

### Problema 2

- a)  $\frac{m}{10} g - T = \frac{m}{10} a \Rightarrow a = g - \frac{10T}{m} = 5.8 \text{ m/s}^2$   
 $rT - M_{attr} = I\alpha = \frac{1}{2} m \cdot 4r^2 \cdot \frac{a}{r} \Rightarrow |M_{attr}| = |r(T - 2ma)| = 11.2 \text{ Nm}$
- b)  $v^2 = v_o^2 + 2a_T \ell \Rightarrow \ell = \frac{v^2}{2a} = 0.345 \text{ m}$

### Problema 3

- a)  $\vec{v}_{CM} = \frac{m\vec{v}_A + m\vec{v}_B}{2m} = \frac{\vec{v}_A + \vec{v}_B}{2} \Rightarrow \vec{v}_{CM} = -0.2 \vec{u}_x \text{ m/s}$
- b)  $\vec{L} = \text{cost} \Rightarrow \frac{\ell}{2} m v_A + \frac{\ell}{2} m |v_B| = I\omega = \frac{2}{3} m \ell^2 \omega \Rightarrow \ell = \frac{3}{4\omega} (v_A + |v_B|) = 1.125 \text{ m}$
- c)  $E_{diss} = \left( \frac{1}{2} I \omega^2 + \frac{1}{2} (2m) v_{CM}^2 \right) - \left( \frac{1}{2} m v_A^2 + \frac{1}{2} m v_B^2 \right) = -0.36 \text{ J}$

### Problema 4

- a)  $T_C = T_B = \frac{p_B V_B}{nR} = 288.7 \text{ K}$
- b)  $V_A = V_C = \frac{nRT_C}{p_C} = 0.064 \text{ m}^3; T_A = T_B \left( \frac{V_B}{V_A} \right)^{\gamma-1} = 335.0 \text{ K} \Rightarrow \Delta U_{CA} = n c_V (T_A - T_C) = 2310 \text{ J}$   
 oppure:  $\Delta U_{ciclo} = 0 \Rightarrow \Delta U_{CA} = -(\Delta U_{AB} + \Delta U_{BC}) = -\Delta U_{AB} = W_{AB} = \frac{1}{\gamma-1} (p_A V_A - p_B V_B)$
- c)  $W_{ABC} = W_{AB} + W_{BC} = -\Delta U_{AB} + nRT_{BC} \ln \frac{V_C}{V_B} = 168 \text{ J}$