Conjoint Analysis

TEORIA ED APPLICAZIONI

Paolo Tessarolo
Università di Padova
Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali
tessarolo@gest.unipd.it

Dove siamo?

GESTIONE AZIENDALE A.A. 2003-2004 - Conjoint Analysis - (C) Paolo Tessarolo, Novembre 2004

La fase di concettualizzazione: opportunità e rischi

- Nella fase di predevelopment l'azienda deve effettuare una scelta
 - Quale prodotto sviluppare tra i tanti possibili?
 - Caratteristiche
 - Prestazioni e le funzioni
 - Forma
 - Tecnologia
- Nella scelta di cui sopra vi sono due rischi
 - Realizzare un prodotto che non soddisfi completamente il mercato
 - Scartare un prodotto che avrebbe potuto essere ottimale per il mercato

GESTIONE AZIENDALE A.A. 2003-2004 - Conjoint Analysis - (C) Paolo Tessarolo, Novembre 2004

L'obiettivo dello sviluppo è la Concept Effectiveness

Concept Effectiveness:

un concetto di prodotto efficace deve essere basato su competenze aziendali finalizzate a soddisfare le esigenze dei clienti e differenziato rispetto all'offerta dei concorrenti

GESTIONE AZIENDALE A.A. 2003-2004 - Conjoint Analysis - (C) Paolo Tessarolo, Novembre 2004

Che cos'è il concetto di prodotto?

- Il concetto di prodotto è una rappresentazione verbale e/o grafica di un possibile nuovo prodotto
 - Benefici per il cliente
 - Forma di massima
 - Tecnologia da utilizzare
 -
- Si passa dall'idea al concetto quando si specificano
 - I benefici per il cliente
 - La forma di massima oppure la tecnologia da utilizzare (Crawford 1991)

Adeguamento del prodotto al mercato

Le attività di pre-development sono estremamente importanti

- E' possibile modificare rapidamente le caratteristiche del prodotto
- Il costo di modifica è praticamente nullo

➔ E' FONDAMENTALE CONCLUDERE IL PREDEVELOPMENT CON UN CONCETTO DI PRODOTTO OTTIMALE PER IL CLIENTE

➔ IL CONCEPT TESTING E' UNA FASE FONDAMENTALE

Cosa è possibile fare mediante il Concept Testing?

- Scelta del prodotto migliore tra i possibili prodotti
- Analisi del posizionamento del prodotto
- Segmentazione del mercato
- Definizione della strategia di pricing e conseguente individuazione del costo obiettivo
- Stima della quota di mercato ottenibile

... dal punto di vista del cliente...

Il sogno psicometrico

- Riuscire a costruire un sistema di preferenze assiomatico del consumatore simile a quello delle scienze fisiche
- ...MA...
- Ciò richiede l'utilizzare sistemi di misura quantitativi (scale) sui quali abbiano senso le operazioni matematiche
 - Le persone hanno difficoltà nella traduzione di preferenze in numeri

I due approcci alla scelta

I due aspetti sono quasi sempre compresenti

Il problema è stato (parzialmente) risolto

MODELLI QUANTITATIVI DI MERCATO

insieme di modelli probabilistici che esprimono relazioni di tipo statistico tra un insieme di variabili misurabili e una variabile dipendente che esprime la scelta o la preferenza

CONJOINT ANALYSIS

insieme di MODELLI QUANTITATIVI DI MERCATO che permettono di rispondere alle domande necessarie ad effettuare il test del concetto

Il problema dei trade-off

Dal punto di vista del cliente la soluzione dei trade off è chiara

- Qualità massima
- Potenza massima
- Handling Massimo
- Capacità di carico massima
- Consumo minimo
- Prezzo minimo

Il prodotto ideale dal p.d.v. del cliente non è né economicamente né tecnicamente realizzabile

I consumatori rappresentano segmenti unitari

- Dovendo scegliere tra i trade-off ed avendo libertà di scelta, ciascun cliente effettuerà una scelta diversa da quella degli altri consumatori
- Per soddisfare le esigenze dei clienti, ciascun prodotto dovrebbe essere realizzato in configurazione unica

Non è facile soddisfare le esigenze dei clienti

- Realisticamente, esistono alcuni trade-off che devono essere considerati
 - Il prodotto con feature estremamente costose non può oggettivamente essere quello venduto al prezzo più basso
 - Può non essere tecnicamente possibile implementare tutte le feature al livello più gradito
 - L'implementazione di alcune feature può ridurre il livello di altre feature
 - L'azienda può realizzare e vendere una varietà che, anche negli approcci segment-of-one (cfr. Stalk & Hout 1991), è limitata. Come conseguenza, i clienti sono raggruppati in segmenti di dimensione superiore all'unità

Conseguenze

I clienti scelgono il prodotto da un'offerta inevitabilmente sub-ottimale

I clienti devono analizzare i trade-off tra i livelli di attributi differenti (in modo percettivo piuttosto che cognitivo)

L'azienda può realizzare soltanto uno o alcuni dei prodotti considerati

L'azienda deve scegliere tra i numerosi prodotti possibili, quale (o quali in numero ridotto) realizzare

L'obiettivo

COMPRENDERE NELLE **PRIME FASI** DELLO SVILUPPO (= bassi costi di cambiamento) **COME SODDISFARE AL MEGLIO LE ESIGENZE DEL CLIENTE** (= come il cliente valuta i trade-off tra gli attributi del prodotto)

Agenda

- Richiami sui modelli di regressione
- Modelli compositivi ed approcci decompositivi
 - I modelli compositivi
 - Definizione, obiettivo e possibili utilizzi della Conjoint Analysis
 - Illustrazione di base del metodo e formalizzazione dei concetti
 - Possibili applicazioni della Conjoint Analysis

Agenda

- Conjoint Analysis "classica"
 - Il software per l'effettuazione della CA classica: un esempio in SPSS
 - Limiti della CA classica
- Conjoint Analysis adattativa
 - Il software per l'effettuazione della CA adattativa: un esempio in Sawtooth ACA
 - Limiti della CA adattativa
- Modelli emergenti di Conjoint Analysis
 - La choiche based CA: un esempio in Sawtooth CBC
 - L'approccio User Design

Il mezzo

- Definire un **MODELLO** (quantitativo) che permetta di sapere già nella fase di sviluppo del concetto:
 - **QUALE PRODOTTO IL CLIENTE PREFERISCE TRA TANTI PRODOTTI POSSIBILI**
 - **QUALI CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DETERMINANO QUESTA SCELTA**

Cos'è un modello quantitativo

Un modello quantitativo è

- una descrizione di un fenomeno osservabile e misurabile
- mediante relazioni quantitative (equazioni)
- che esprimono la dipendenza del fenomeno da altre variabili osservabili e misurabili

I modelli possono essere deterministici o probabilistici

Esempio: un modello deterministico

Le caratteristiche dei modelli deterministici

- SI BASANO SU UN SISTEMA ASSIOMATICO BEN DEFINITO
- DESCRIVONO ESATTAMENTE LA REALTÀ IN CONDIZIONI CONTROLLATE

Quando le condizioni di controllo (assiomi) sono soddisfatte, il modello descrive esattamente la realtà (cioè: il modello è esatto nel 100% dei casi)

Esempio di modello deterministico

Esempio di modello probabilistico

Esempio di modello probabilistico

- Esiste una relazione esatta (deterministica) tra spesa in pubblicità e fatturato?
- La risposta è ovviamente NO
- Vi sono moltissime variabili che hanno un'influenza non trascurabile sul fatturato
 - Stagione
 - Stato generale dell'economia
 - Prezzo
 - Tipo di prodotto
 - Situazione familiare del direttore commerciale
 - Situazione familiare del cliente
 - ...

Esempio di modello probabilistico

- Anche includendo un numero estremamente elevato di variabili indipendenti è impossibile realizzare un modello che permetta di prevedere **ESATTAMENTE** il valore del fatturato a partire da queste variabili
- Per quanto possa essere complicato il modello, esistono comunque fenomeni stocastici (= non prevedibili) che possono influenzare il fatturato

La caratteristica fondamentale dei modelli probabilistici

Esempio di modello probabilistico: dati empirici

Mese	Spesa in pubblicità (SP)	Fatturato (FATT)
1	1.000	10.000
2	2.000	10.000
3	3.000	20.000
4	4.000	20.000
5	5.000	40.000

GESTIONE AZIENDALE A.A. 2003-2004 - Conjoint Analysis - (C) Paolo Tassarolo, Novembre 2004

Andamento dei dati

GESTIONE AZIENDALE A.A. 2003-2004 - Conjoint Analysis - (C) Paolo Tassarolo, Novembre 2004

Andamento dei dati

GESTIONE AZIENDALE A.A. 2003-2004 - Conjoint Analysis - (C) Paolo Tassarolo, Novembre 2004

Altre caratteristiche fondamentali dei modelli probabilistici

- Il modello stocastico permette di prevedere una tendenza centrale (cioè un valore atteso) e non un valore puntuale
- L'errore stocastico esprime la deviazione della singola osservazione rispetto al valore atteso
- Tale deviazione è imputabile a variabili indipendenti ignote che influenzano la variabile/le variabili dipendenti

GESTIONE AZIENDALE A.A. 2003-2004 - Conjoint Analysis - (C) Paolo Tassarolo, Novembre 2004

Le caratteristiche dei modelli probabilistici

- SI BASANO SU UN INSIEME DI IPOTESI SOLTANTO PARZIALE
- NON DESCRIVONO ESATTAMENTE LA REALTA', BENSÌ UNA TENDENZA DELLA REALTA'

Il modello stocastico non descrive esattamente la realtà e non è quindi esatto nel 100% dei casi.
E' però possibile stimare la probabilità con cui la realtà si comporterà come previsto dal modello

La probabilità è data dai *p-value* associati al modello

Come calcolare i parametri e i *p-value* associati al modello?

- I parametri (coefficienti $a, b, c, \dots$ nell'esempio precedente), il *p-value* del modello, i *p-value* dei parametri e il coefficiente di determinazione sono calcolati dai più comuni software statistici (e non):
 - SPSS
 - SAS System
 - Excel

Come deve essere un buon modello?

- LA DISPERSIONE INTORNO ALLA TENDENZA CENTRALE DEVE ESSERE RIDOTTA E L'ERRORE DEVE ESSERE PICCOLO
- LA PROBABILITA' CHE LA REALTA' SI COMPORTI COME IL MODELLO DEVE ESSERE ELEVATA

LE ASSUNZIONI DEVONO ESSERE RAGIONEVOLI

Obiettivo finale per l'effettuazione del test del concetto

- Costruire un modello probabilistico che permetta di prevedere quale tra n prodotti alternativi, che l'azienda può sviluppare in dettaglio, sarà quello più gradito al segmento di mercato obiettivo dell'azienda.

Come "modellare" il prodotto?

Ipotesi di base

- Il consumatore sceglie tra prodotti alternativi in base alle differenze di utilità tra di essi
- Il processo di acquisto può quindi essere schematizzato come segue

Il processo è di tipo percettivo piuttosto che cognitivo

Una seconda ipotesi

- Che cosa determina il livello di utilità di un determinato prodotto per un determinato cliente?

I prodotti sono caratterizzati da attributi

I prodotti possibili derivano dalla combinazione di livelli per ciascun attributo

Prodotti possibili

Assegnando un livello (di presenza) a ciascun attributo si ottiene un prodotto possibile

Il numero di prodotti dipende dal numero di livelli e di attributi

Il numero di prodotti possibili P realizzabile a partire da k attributi, ciascuno dei quali ha n_i livelli, è dato da:

$$P = \prod_{i=1}^k n_i$$

- Gli attributi per i quali non sono previsti livelli multipli ($n_i=1$) non aumentano il numero di prodotti possibili

Ipotesi di base

- Che cosa determina il livello di utilità di un determinato prodotto per un determinato cliente?

→ L'utilità dipende da cosa contiene il prodotto, cioè dipende dai livelli degli attributi che esso offre al cliente all'atto della scelta.

→ In particolare, la scelta sarà determinata solo dagli attributi che possono essere presenti con valori diversi

Modello Additivo

- L'utilità di un possibile prodotto per il rispondente è dato dalla somma delle utilità dei livelli di ciascun attributo da cui il prodotto è composto

UTILITA' Totale =
Utilità potenza +
Utilità accelerazione +
Utilità posti +
Utilità rimorchio +
Utilità consumo +
Utilità capacità di carico +
Prezzo

È possibile semplificare il problema

Se riesce a misurare l'utilità di ciascun livello di ciascun attributo, l'azienda si pone nella posizione ottimale per progettare e sviluppare quei pochi prodotti p , tra i molti P prodotti possibili, ottenibili dalle combinazioni dei livelli per ciascun attributo, che permettono di soddisfare al massimo livello i clienti

Come capire i desideri dei clienti?

- Chiedere direttamente la preferenza
- Nel caso della carta di credito:
 - Che brand preferisci?
 - Quale tasso di interesse vorresti?
 - Quanto vorresti spendere all'anno?
 - Che limite di credito desideri?

È efficace chiedere al cliente come vuole il prodotto in termini di attributi?

Se si chiede qual è il prodotto preferito la risposta è scontata

Sport Utility Vehicle

- Numero posti
 - 5 posti
 - 7 posti
- Capacità di carico
 - 90 cu ft
 - 50 cu ft
- Consumo
 - 23 mpg
 - 17 mpg
- Potenza
 - 185 hp
 - 240 hp
- Accelerazione
 - 0-60 mph in 7sec.
 - 0-60 mph in 10 sec.
- Traino
 - 2000 lbs
 - 5000 lbs
- Prezzo
 - \$29.000
 - \$37.000

Questo metodo non funziona!

- Le risposte sono generalmente triviali
- Esse inoltre non aggiungono informazioni utili all'ottimizzazione del concetto

- I RISPONDENTI PREFERISCONO SEMPRE
 - Marche note piuttosto che sconosciute
 - Prezzi bassi piuttosto che prezzi alti
 - Tassi di interesse bassi piuttosto che alti
 - Alti limiti di credito piuttosto che bassi

Conseguenze

- Non è possibile chiedere semplicemente al cliente "Che cosa preferisci?"

- La risposta a tale domanda non permette di trarre nessuna conclusione

- Servono metodi più sofisticati e quantitativi

Approcci di base

Per “catturare” la modalità con cui giudica i prodotti impiegando uno dei seguenti due approcci:

- Composizione: si chiede al rispondente di valutare i livelli di ciascun attributo in modo comparato a prescindere dagli altri attributi e si utilizza l'ipotesi additiva per ricavare l'utilità di ciascun concetto dal punto di vista del cliente
- Decomposizione: si chiede al rispondente di valutare ciascun prodotto possibile e si utilizza l'ipotesi additiva per ricavare l'utilità dei livelli per ciascun attributo dal punto di vista del cliente

I passi per la composizione

- Chiedere al cliente, per ciascun attributo, di attribuire un punteggio a ciascun livello crescente in base all'utilità del livello rispetto agli altri
- Chiedere al cliente di fissare dei pesi tra gli attributi
- Calcolare l'utilità di un prodotto, inteso come specifica combinazione di attributi e livelli, sommando i singoli punteggi dei livelli moltiplicati per il peso dell'attributo a cui il livello appartiene

Funzione di utilità parziale

- La funzione di utilità parziale, per un certo attributo i , correla ciascun livello λ_j all'utilità di quel livello

$$U_i = f(\lambda_j)$$

- Nel seguito si assume che U_i sia una variabile continua definita in un intervallo (risposta metrica). Nella pratica si assume che una risposta su scala ordinale (es. scala Likert 1-5 o 1-10) approssimi bene una variabile continua
- Nel caso in cui U_i sia una variabile categoriale ordinale (ranking) si parla di risposta non metrica.

Un esempio di risposta metrica e non metrica

- Caso di risposta metrica (scoring):
 - Assegnare un punteggio su una scala 1 (utilità minima)-10 (utilità massima) ai seguenti livelli relativi all'attributo “brand” riferito al prodotto carta di credito
 - VISA
 - MASTERCARD
 - DISCOVER
 -
- Caso di risposta non metrica (ranking):
 - Ordinare per utilità crescente i seguenti livelli relativi all'attributo “brand” riferito al prodotto carta di credito
 - VISA
 - MASTERCARD
 - DISCOVER

Si adotta una semplificazione per le risposte non metriche

Le risposte non metriche prevedono tecniche diverse da quelle esaminate nel seguito

- A scopo puramente didattico si adotta la semplificazione secondo cui risposte metriche e non metriche vengono trattate allo stesso modo
- Nelle pratiche applicazioni è necessario utilizzare tecniche appropriate per le risposte non metriche

La richiesta dei Part Worth

- Nell'approccio compositivo si richiede il part worth rispondente (ad esempio chiedendo di valutare i livelli per ciascun attributo su una scala 1-10)
- Rappresentazione grafica della funzione di utilità parziale per l'attributo "potenza" con livelli "185HP" e "240HP" e per l'attributo "Posti" con livelli "7posti" e "5 posti"

La richiesta dei pesi

- È poi necessario chiedere al rispondente di attribuire un peso a ciascun attributo (ad esempio su una scala 1-10)
- Si semplifica l'esempio supponendo due soli attributi

Attributo	Score (1-10)	Peso
Potenza	9	$(9/16)=56,25\%$
Posti	7	$(7/16)=43,75\%$
Somma	16	100%

Il calcolo dell'utilità

Prodotto	Valore pesato Potenza	Valore pesato Posti	Valore prodotto
185HP+5posti	$6*0,5625=3,375$	$7*0,4375=3,0625$	$3,375+3,0625=6,4375$
185HP+7posti	$6*0,5625=3,375$	$3*0,4375=1,3125$	$3,375+1,3125=4,6875$
240HP+5posti	$10*0,5625=5,625$	$7*0,4375=3,0625$	$5,625+3,0625=8,6875$
240HP+7posti	$10*0,5625=5,625$	$3*0,4375=1,3125$	$5,625+1,3125=6,9375$

Dal part worth all' utilità totale

- Secondo il modello additivo

L'approccio seguito è compositivo

- L'approccio seguito nell'esempio precedente è di tipo compositivo

Funzioni di utilità parziale $\Rightarrow$ Funzione di utilità totale

Self-Explicated Multi-Attribute Models

- I modelli di marketing della famiglia Self-explicated models utilizzano una combinazione di domande del tipo:
 - "Quali brand preferisci?"
 - "Qual'è l'importanza del brand rispetto agli altri attributi?"
- Per ciascun attributo (brand, prezzo, prestazioni, etc.) i rispondenti attribuiscono un punteggio oppure effettuano un *ranking* dei livelli all'interno di quell'attributo
- Successivamente, i rispondente attribuiscono un punteggio dell'attributo rispetto agli altri attributi
- Le utilità relative ai singoli concetti (preference score) possono essere sviluppati combinando le preferenze per i livelli con l'importanza degli attributi

Le fasi di costruzione di un modello Self Explicated

Quante domande in un self-explicated model?

- Per ricavare i livelli di utilità è estremamente importante contenere il numero di domande da porre all'intervistato
 - Nei modelli Self Explicated
 - 1 domanda (max) per ciascun livello (sia λ_i il numero di livelli relativi all'attributo i-esimo)
 - 1 domanda per il peso tra gli attributi
- In totale sono necessarie D domande, dove:

$$D = \sum \lambda_i + 1$$

I modelli self explicated sono pericolosi nell'effettuazione del concept test

Il Pericolo connessi all'approccio self explicated

Perché si ottiene questo risultato con i modelli self explicated?

- I modelli self-explicated non simulano un processo di acquisto real-world
 - Essi prevedono che si chieda al rispondente di valutare i livelli e di valutare l'importanza relativa degli attributi
- ➡ Il rispondente non valuta mai il prodotto nel suo insieme
- ➡ Il rispondente non è costretto a considerare i trade-off tra livelli prestabiliti di ciascun attributo
- Tipicamente questa famiglia di modelli tende a sopravvalutare l'importanza del prezzo
 - In alcuni casi tuttavia il loro comportamento previsivo è molto buono

Basso potere discriminante

- Nei self-explicated model i rispondenti tendono a valutare tutti gli attributi con un livello simile di importanza
- Questa è la conseguenza del fatto che il rispondente non deve considerare i trade-off

L'approccio decompositivo

- È molto più utile un approccio decompositivo

- Cosa succede all'utilità totale del prodotto se modifico il livello di un attributo?
- Quali sono i trade-off nella mente del cliente?

Illustrazione preliminare del metodo

- Prodotto: disposable diaper

Calcolo dei prodotti possibili

- Il numero di possibili prodotti definiti a partire dalla combinazione dei livelli di ciascun attributo è pari a:

$$N = 2 \times 3 = 6$$

Sono sei i prodotti possibili

Diaper 1 Price: \$5 Elastic waistband	Diaper 2 Price: \$6 Elastic waistband	Diaper 3 Price: \$7 Elastic waistband
Diaper 4 Price: \$5 No Elastic waistband	Diaper 5 Price: \$5 No Elastic waistband	Diaper 6 Price: \$5 No Elastic waistband

Illustrazione preliminare del metodo

- Si chiede al rispondente di ordinare i sei prodotti in ordine di preferenza

Elastic Waistband	Price	Rank
Yes	\$5	1
Yes	\$6	2
Yes	\$7	4
No	\$5	3
No	\$6	5
No	\$7	6

- SI NOTI CHE IN QUESTO CASO LA RISPOSTA è NON METRICA

- L'analisi che segue è semplificata

Grafico del ranking

Nota: a valore minore corrisponde utilità maggiore (e.g. il prodotto con ranking 1 è il preferito)

È necessario riscalfare

- Per decomporre l'utilità è necessario che i prodotti maggiormente preferiti corrispondano a valori numerici maggiori
- Il ranking è una tecnica di reverse scoring
 - I prodotti con il ranking più basso sono i prodotti preferiti dal rispondente
 - È necessario ricodificare il ranking in scoring non reverse

$N = 6 - V$

6	0	3	3
5	1	2	4
4	2	1	5

$N = 27 - V$

6	21	3	24
5	22	2	25
4	23	1	26

Illustrazione preliminare del metodo

- La risposta evidenzia che il rispondente è disposto a pagare almeno \$1 ma meno di \$2 in più rispetto al prezzo base per avere l'elastic waistband

Dal ranking all'utilità

		Elastic Waistband		Media
		YES	NO	
Price	\$5	5	3	4
	\$6	4	1	2.5
	\$7	2	0	1
Media		3.67	1.33	

Decomposizione dell'utilità

- È possibile ricostruire il sistema di utilità (Utility System) del rispondente
- Il sistema di utilità
 - è definito in un intervallo (continuo) → metodi metrici
 - rispetta il ranking (discreto) del rispondente

Prodotto	Value System Score	Value system Score Rank	Stated Original Rank
\$5+Elastic	$3.67+4=7.67$	1	1
\$6+Elastic	$3.67+2.5=6.17$	2	2
\$7+Elastic	$3.67+1=4.67$	4	4
\$5+No elastic	$1.33+4=5.33$	3	3
\$6 No elastic	$1.33+2.5=3.83$	5	5
\$7 No elastic	$1.33+1=2.33$	6	6

È possibile calcolare la funzione di utilità

Le funzioni di utilità parziale si ricavano dalle medie in riga e colonna

L'eliminazione dell'elastic wastband produce una riduzione di utilità pari a 2.34

L'aumento del prezzo di un dollaro riduce l'utilità di 1.5

	Elastic Wastband		Media
	YES	NO	
Price	\$5	3	4
	\$6	4	2.5
	\$7	2	0
Media	3.67	1.33	

Il trade-off tra \$\$ e wastband

- Calcolo del valore in \$ dal punto di vista del cliente dell'elastic wastband secondo un modello lineare

$$1 : 1.5 = x : 2.34$$

$$x = \frac{2.34}{1.5} = 1.56\$$$

Il trade-off e la decisione di sviluppo

- L'azienda può ora decidere quale prodotto sviluppare
 - Se l'aggiunta dell'elastic wastband costa meno di \$1.56 allora conviene sviluppare il prodotto con l'elastico e venderlo al prezzo del pannolino senza elastico (baseline price) + 1.56\$
 - Se invece l'elastico costa di più, allora non conviene produrre il pannolino con l'elastico
 - L'azienda deve inoltre considerare che ad ogni aumento di \$1 del prezzo del pannolino si ha una riduzione di 1.5 punti nell'utilità. Questa informazione può essere utilizzata nelle strategie di pricing.

Approccio decompositivo

Le conclusioni non dipendono dal riscaldamento

- Le conclusioni sui trade off del cliente dipende solo dalla differenza di utilità tra i livelli
- Esempio:

		Elastic Wastband		Media			Elastic Wastband		Media
		S	NO				YES	NO	
Price	\$5	7	5	6	Price	\$5	5	3	4
	\$6	6	3	4.5		\$6	4	1	2.5
	\$7	4	2	3		\$7	2	0	1
Media		7	3.33		Media		3.67	1.33	

Le conclusioni non dipendono dal riscaldamento

L'aumento del prezzo di un dollaro riduce l'utilità di 1.5

L'eliminazione dell'elastic wastband produce una riduzione di utilità pari a 2.34

Le conclusioni non dipendono dal riscaldamento

		Elastic Wastband		Media	Prodotto	Value System Score	Value system Score Rank	Stated Original Rank
		S	NO					
Price	\$5	7	5	6	\$5+Elastic	5.67+6=11.67	1	1
	\$6	6	3	4.5	\$6+Elastic	5.67+4.5=10.17	2	2
	\$7	4	2	3	\$7+Elastic	5.67+3=8.67	4	4
Media		7	3.33		\$5+No elastic	3.33+6=9.33	3	3
					\$6+No elastic	3.33+4.5=7.83	5	5
					\$7+No elastic	3.33+3=6.33	6	6

Summary

- Nelle prime fasi di sviluppo dei nuovi prodotti è necessario valutare concetti di prodotto alternativi
- I concetti alternativi possono essere espressi in termini di attributi e livelli possibili per ciascun attributo
- La valutazione dei concetti alternativi deve essere orientata al cliente
- Per raccogliere le opinioni dei clienti sono possibili due approcci
 - Approccio compositivo: dalle curve di utilità parziale (giudizio sui livelli di ciascun attributo) alla funzione di utilità totale
 - Approccio decompositivo: dalla funzione di utilità totale alle funzioni di utilità parziale

Summary

- L'approccio compositivo generalmente è inefficace e statisticamente debole
 - Si utilizza per lo più un approccio decompositivo
- Quando il numero di livelli e di attributi è ridotto è possibile calcolare direttamente le curve di utilità parziale a partire dal ranking dei prodotti possibili
 - Ranking dei possibili prodotti da parte del cliente
 - Scoring dei profili
 - Costruzione della matrice dei livelli
 - Calcolo delle medie per riga e per colonna -> curve di utilità parziale
 - Calcolo del Value System Score del rispondente come somma delle utilità parziali
- I METODI CHE SI BASANO SULL'APPROCCIO DECOMPOSITIVO SONO DETTI CONJOINT ANALYSIS

Limitazioni

- La trattazione precedente illustra in modo intuitivo un metodo decompositivo
- Essa evidenzia altresì alcune limitazioni:
 - La relazione tra ranking/scoring e utilità parziali non è chiara. Si è infatti utilizzata una semplice media. Questo approccio è giustificabile da un p.d.v. teorico?
 - Esso è inoltre stato utilizzato con un solo rispondente. Come trattare rispondenti multipli?

Limitazioni

(limitazioni – continua)

- L'approccio "matrice + medie" è utilizzabile solo quando i prodotti sono caratterizzati da pochi attributi e pochi livelli. Come fare quando il numero dei livelli aumenta?
- Ammesso che esista un metodo che permetta di "fare i conti" con prodotti complessi, come gestire l'intervista con il rispondente?
- È necessario formalizzare da un p.d.v. matematico/statistico quanto visto

Che cos'è la Conjoint Analysis

Si definisce Conjoint Analysis un qualsiasi metodo decompositivo che permetta la quantificazione dei trade-off del cliente tra gli attributi del prodotto, sulla base di un modello decisionale assunto a priori, basato sulle valutazioni del cliente di prodotti caratterizzati da due o più attributi, ciascuno dei quali con due o più livelli, utilizzando i principi dell'Experimental Design

Si definiscono Conjoint Analysis anche tutti i metodi che, aventi lo stesso obiettivo, si basano su una combinazione di decomposizione e composizione.

Osservazioni sulla definizione

- La CA è (principalmente) un metodo decompositivo
 - Si chiede al rispondente di esplicitare la funzione di utilità totale e si ricavano le funzioni di utilità parziale
- La CA si basa sull'assunzione relativa alla struttura decisionale del rispondente.
 - La struttura decisionale è una forma funzionale di una particolare famiglia di modelli di marketing (alternative preference models) che relaziona i livelli degli attributi all'utilità totale

Osservazioni sulla definizione

- La Conjoint Analysis adotta (almeno in parte) i principi dell'Experimental Design
 - Un modello di Experimental Design (detto anche DOE – Design of Experiment) è utilizzato per valutare gli effetti di tutti i possibili trattamenti (treatments) su una variabile di risposta
 - Un trattamento è una combinazione di livelli per ciascun attributo che determinano la risposta

Experimental design

- Nell'ambito della Conjoint Analysis:
 - La variabile dipendente o risposta è l'**UTILITA'**
 - Il trattamento è una specifica combinazione di livelli per ciascun attributo
 - Il trattamento è un **PRODOTTO POSSIBILE**

Vantaggio dell'Experimental Design

Alternative Preference Models

- Sia data la variabile dipendente “utilità totale” U e le n variabili indipendenti $\lambda_i, i=1, \dots, n$ dette “attributi”.
- Si definisce modello della struttura decisionale (alternative preference model) una qualunque* funzione del tipo:

$$U = f(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

Alternative Preference Models

- Per effettuare la CA è necessario assumere a priori una forma funzionale per il preference model
- Le assunzioni più comuni sono:
 - **Part Worth Model**
 - Vector Linear Model
 - Ideal Point Model

Il part worth model si basa sull'assunzione additiva

- Se si assume ancora un modello additivo, secondo cui l'utilità relativa al prodotto è data dalla somma delle utilità relative agli attributi si ha che per l' i -esimo prodotto possibile:

$$U_i = \sum_j U_{ij}$$

È nota, viene chiesta al rispondente

La stima delle utilità parziali è l'obiettivo del metodo

Per formalizzare è necessario introdurre le variabili dummy

	\$5	\$6	\$7	YES	NO
P1	1	0	0	1	0
P2	0	1	0	1	0
P3	0	0	1	1	0
P4	1	0	0	0	1
P5	0	1	0	0	1
P6	0	0	1	0	1

È possibile definire due variabili dummy ($k=1$ e $k=2$) per ciascun prodotto i ($i=1, \dots, 6$):

$X_{1j} = 1$ se il livello i -esimo del primo attributo è presente nel prodotto, 0 altrimenti ($j=\$5, \$6, \$7$)

$X_{2j} = 1$ se il livello j -esimo del secondo attributo è presente nel prodotto, 0 altrimenti ($j=yes, no$)

Part Worth Model

$$Y_i = \sum_k \sum_j w_{kj} X_{kji} + e_i$$

dove:

- Y_i l'utilità per l'i-esimo prodotto (inteso come specifica combinazione di livelli per ciascun attributo)
- X_{kji} una variabile binaria (dummy variable) che assume il valore 1 se il livello j-esimo dell'attributo k è presente nell'i-esimo prodotto, 0 se esso non è presente
- w_{kji} è un opportuno coefficiente, detto part worth relativo al livello j dell'attributo k
- e_i è l'errore associato alla preferenza dell'i-esimo prodotto dovuto al fatto che la relazione non è di tipo matematico bensì statistico

Vector linear model

$$Y_i = \alpha + \beta_k X_{ki} + e_i$$

dove

X_{ki} = valore del k-esimo attributo nel prodotto i-esimo

α = intercetta

β_k = effetto (lineare) dell'attributo k sull'utilità

e_i = errore

Il modello vale soltanto nell'ipotesi di X_{ki} continua per ogni k (è un caso particolare del part worth model): es. prezzo, consumo, velocità massima, potenza etc.

Ideal point model

$$Y_i = \alpha' + \beta'_k (X_{ki} - X_{kl})^2 + e_i$$

Dove

X_{kl} = livello ideale dell'attributo k

β'_k = effetto della deviazione al quadrato dal livello ideale dell'attributo k-esimo sull'utilità

e_i = errore

Il modello vale se è definibile un valore ideale e finito per ogni attributo k. Es. consumo=0, prezzo=0.

Per ulteriori approfondimenti...

- Per ulteriori approfondimenti sui modelli si rimanda a: Green P. E. and Srinivasan V. (1978) "Conjoint Analysis in Consumer Research: Issues and Outlook." J. Consumer Research. Vol. 5, pp. 103-123.

NEL SEGUITO SI FARÀ RIFERIMENTO
UNICAMENTE AL PART WORTH MODEL

I prodotti possibili

Diaper 1 Price: \$5 Elastic waistband	Diaper 2 Price: \$6 Elastic waistband	Diaper 3 Price: \$7 Elastic waistband
Diaper 4 Price: \$5 No Elastic waistband	Diaper 5 Price: \$6 No Elastic waistband	Diaper 6 Price: \$7 No Elastic waistband

Part worth model - esempio

$$Y_i = w_{11}X_{11i} + w_{12}X_{12i} + w_{13}X_{13i} + w_{21}X_{21i} + w_{22}X_{22i} + e_i$$

Diaper 1 Price: \$5 Elastic waistband	$Y_1 = w_{11} \cdot 1 + w_{12} \cdot 0 + w_{13} \cdot 0 + w_{21} \cdot 1 + w_{22} \cdot 0 + e_1 =$ $= w_{11} + w_{21} + e_1$
Diaper 2 Price: \$6 Elastic waistband	$Y_2 = w_{11} \cdot 0 + w_{12} \cdot 1 + w_{13} \cdot 0 + w_{21} \cdot 1 + w_{22} \cdot 0 + e_2 =$ $= w_{12} + w_{21} + e_2$
Diaper 3 Price: \$7 Elastic waistband	$Y_3 = w_{11} \cdot 0 + w_{12} \cdot 0 + w_{13} \cdot 1 + w_{21} \cdot 1 + w_{22} \cdot 0 + e_3 =$ $= w_{13} + w_{21} + e_3$

Part worth model - esempio

Diaper 4 Price: \$5 No Elastic waistband	$Y_4 = w_{11} \cdot 1 + w_{12} \cdot 0 + w_{13} \cdot 0 + w_{21} \cdot 0 + w_{22} \cdot 1 + e_4 =$ $= w_{11} + w_{22} + e_4$
Diaper 5 Price: \$6 No Elastic waistband	$Y_5 = w_{11} \cdot 0 + w_{12} \cdot 1 + w_{13} \cdot 0 + w_{21} \cdot 0 + w_{22} \cdot 1 + e_5 =$ $= w_{12} + w_{22} + e_5$
Diaper 6 Price: \$7 No Elastic waistband	$Y_6 = w_{11} \cdot 0 + w_{12} \cdot 0 + w_{13} \cdot 1 + w_{21} \cdot 0 + w_{22} \cdot 1 + e_6 =$ $= w_{13} + w_{22} + e_6$

Scrittura in forma matriciale

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \\ Y_4 \\ Y_5 \\ Y_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_{11} \\ w_{12} \\ w_{13} \\ w_{21} \\ w_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \\ e_5 \\ e_6 \end{bmatrix}$$

Part worth model - esempio

$$Y_i = w_{11} \cdot X_{11i} + w_{12} \cdot X_{12i} + w_{13} \cdot X_{13i} + w_{21} \cdot X_{21i} + w_{22} \cdot X_{22i} + e_i$$

Diaper 1 Price: \$5 Elastic waistband	$Y_1 = w_{11} \cdot 1 + w_{12} \cdot 0 + w_{13} \cdot 0 + w_{21} \cdot 1 + w_{22} \cdot 0 + e_1 = w_{11} + w_{21} + e_1$
Diaper 2 Price: \$6 Elastic waistband	$Y_2 = w_{11} \cdot 0 + w_{12} \cdot 1 + w_{13} \cdot 0 + w_{21} \cdot 1 + w_{22} \cdot 0 + e_2 = w_{12} + w_{21} + e_2$
Diaper 3 Price: \$7 Elastic waistband	$Y_3 = w_{11} \cdot 0 + w_{12} \cdot 0 + w_{13} \cdot 1 + w_{21} \cdot 1 + w_{22} \cdot 0 + e_3 = w_{13} + w_{21} + e_3$

Part worth model - esempio

Diaper 4 Price: \$5 No Elastic waistband	$Y_4 = w_{11} \cdot 1 + w_{12} \cdot 0 + w_{13} \cdot 0 + w_{21} \cdot 0 + w_{22} \cdot 1 + e_4 = w_{11} + w_{22} + e_4$
Diaper 5 Price: \$5 No Elastic waistband	$Y_5 = w_{11} \cdot 0 + w_{12} \cdot 1 + w_{13} \cdot 0 + w_{21} \cdot 0 + w_{22} \cdot 1 + e_5 = w_{12} + w_{22} + e_5$
Diaper 6 Price: \$5 No Elastic waistband	$Y_6 = w_{11} \cdot 0 + w_{12} \cdot 0 + w_{13} \cdot 1 + w_{21} \cdot 0 + w_{22} \cdot 1 + e_6 = w_{13} + w_{22} + e_6$

Come stimare i w_{kj} ?

Come stimare i w_{kj} ?

- Il vettore dei part worth $\bar{w}$ è tale per cui la funzione:

$$\sum_{i=1}^N (y_i - x_i \bar{w})^2$$

risulta minimizzata, dove:

y_i è l'utilità del i-esimo prodotto possibile

x_i è la i-esima riga della matrice $\mathbf{X}$ (vettore riga)

Part worth model - esempio

$$Y_i = w_{11}X_{11i} + w_{12}X_{12i} + w_{13}X_{13i} + w_{21}X_{21i} + w_{22}X_{22i} + e_i$$

Diaper 1 Price: \$5 Elastic waistband	$Y_1 = w_{11} \cdot 1 + w_{12} \cdot 0 + w_{13} \cdot 0 + w_{21} \cdot 1 + w_{22} \cdot 0 + e_1 = w_{11} + w_{21} + e_1$
Diaper 2 Price: \$6 Elastic waistband	$Y_2 = w_{11} \cdot 0 + w_{12} \cdot 1 + w_{13} \cdot 0 + w_{21} \cdot 1 + w_{22} \cdot 0 + e_2 = w_{21} + e_2$
Diaper 3 Price: \$7 Elastic waistband	$Y_3 = w_{11} \cdot 0 + w_{12} \cdot 0 + w_{13} \cdot 1 + w_{21} \cdot 1 + w_{22} \cdot 0 + e_3 = w_{13} + w_{21} + e_3$

Part worth model - esempio

Diaper 4 Price: \$5 No Elastic waistband	$Y_4 = w_{11} \cdot 1 + w_{12} \cdot 0 + w_{13} \cdot 0 + w_{21} \cdot 0 + w_{22} \cdot 1 + e_4 = w_{11} + e_4$
Diaper 5 Price: \$5 No Elastic waistband	$Y_5 = w_{11} \cdot 0 + w_{12} \cdot 1 + w_{13} \cdot 0 + w_{21} \cdot 0 + w_{22} \cdot 1 + e_5 = w_{12} + w_{22} + e_5$
Diaper 6 Price: \$5 No Elastic waistband	$Y_6 = w_{11} \cdot 0 + w_{12} \cdot 0 + w_{13} \cdot 1 + w_{21} \cdot 0 + w_{22} \cdot 1 + e_6 = w_{13} + w_{22} + e_6$

Sui parametri da stimare

- È sufficiente stimare tre parametri del modello Part Worth
- Sono a disposizione 6 equazioni sperimentali
 - È possibile stimare i parametri utilizzando meno di 6 equazioni sperimentali
 - È possibile ridurre il numero di prodotti da sottoporre all'intervistato rispetto al numero di prodotti possibili

Sui parametri da stimare

Tra i pregi principali dei metodi decompositivi vi è quello di offrire la possibilità di stimare l'utilità di tutti i possibili prodotti nonché tutte le funzioni di utilità parziale avendo informazioni solo su un sottoinsieme ridotto di prodotti possibili

In generale, sia dato un prodotto composto da P attributi, ciascuno caratterizzato da m_p livelli. Il numero di prodotti possibili è:

$$n = \sum_{p=1}^P (m_p - 1) = \sum_{p=1}^P m_p - P$$

- Il numero di coefficienti di utilità da stimare è pari a:

$$\prod_{p=1}^P m_p$$

Sul numero minimo di domande

- È possibile utilizzare il numero minimo di osservazioni sperimentali
- RISPOSTA SINTETICA: NO!

Sul numero minimo di domande

- Il modello si basa su numerose assunzioni:
 - modello additivo e part worth model
 - ogni attributo contribuisce all'utilità
 - il contributo di ciascun attributo non dipende dalla presenza di altri attributi
- Se si utilizza un numero di equazioni uguale al numero di parametri da stimare il modello risulta sempre identificato (=esiste una soluzione)

NON E' MAI POSSIBILE RIFIUTARE IL MODELLO

- È inoltre necessario considerare che il rispondente non conosce esattamente il valore di utilità di ciascun livello di ciascun attributo e spesso non ragiona in modo lineare

È NECESSARIO RICHIEDERE AL RISPONDENTE LE STESSE INFORMAZIONI PIÙ DI UNA VOLTÀ E STIMARE PER VIA STATISTICA (ANZICHÈ NUMERICA) I PARAMETRI

Come possono essere i modelli probabilistici?

- UNDERIDENTIFIED: il numero di data points è minore rispetto al numero di parametri da stimare (Non è possibile stimare i parametri del modello)
- JUSTIDENTIFIED: il numero di data points è esattamente uguale al numero di parametri da stimare* (esiste una sola stima per i parametri del modello)
- OVERIDENTIFIED: il numero di data points è maggiore rispetto al numero di parametri da stimare* (esistono infinite stime per i parametri del modello)

* Condizione necessaria ma non sufficiente

Cosa sono i gradi di libertà?

Gradi di libertà di un modello = Numero di data points – numero di parametri da stimare

Nel caso in esame si ha:

Numero di data points = 3 (numero di prodotti testati)

Numero di parametri da stimare = 3 (fissato)

Gradi di libertà = 0

È necessario aumentare il numero di data points (= numero di domande = numero di prodotti possibili testati) al fine di avere un numero di gradi di libertà positivo

Come procedere in pratica?

- Nel caso di prodotti particolarmente semplici
 - Pochi attributi
 - Pochi livelli per attributo
 - è conveniente proporre tutti i possibili prodotti al rispondente
- Nel caso di prodotti più complessi, ciò non è possibile per motivi di information overloading. Ad esempio, se si hanno 8 attributi con 2 livelli per attributo, si hanno $2^8=256$ prodotti
- La teoria dell'Experimental Design permette di ridurre in modo consistente il numero di profili sottoposti a misurazione empirica

Experimental design: cos'è

- L'experimental design è un insieme di tecniche statistiche e sperimentali che ha come obiettivo la comprensione dell'effetto su una variabile dipendente e misurabile (response) di un certo numero di variabili indipendenti che la determinano (factors o treatments), ciascuno dei quali è caratterizzato da un campo di variazione noto e discreto all'interno di un insieme di livelli (levels).
- L'obiettivo dell'Experimental Design è definire criteri tali per cui, utilizzando un numero minimo di osservazioni sperimentali (=misurazioni) relative ai trattamenti e alla response corrispondente, sia possibile conoscere la relazione tra questi.

Experimental design e CA

- Nell'ambito della Conjoint Analysis
 - La response è l'utilità per il rispondente
 - I fattori o trattamenti corrispondono agli attributi del prodotto
 - I livelli dei fattori corrispondono ai livelli degli attributi
- L'obiettivo è quindi quello di stabilire qual è il numero minimo di combinazioni di livelli per ciascun attributo (e quali sono le combinazioni) che è necessario misurare empiricamente per stimare in modo preciso la relazione

Il piano fattoriale completo

- Si definisce piano fattoriale completo l'insieme di tutte le possibili combinazioni di trattamenti
- Nell'ambito CA, il piano fattoriale completo è l'insieme dei possibili prodotti
- Esistono particolari sottoinsiemi dei piani fattoriali completi che permettono di stimare con un numero inferiore di esperimenti tutte le relazioni (a meno di effetti di interazione) tra risposte e trattamenti, utilizzando modelli overidentified.
- Esistono particolari sottoinsiemi per i quali il numero di esperimenti è minimo. Tali sottoinsiemi sono detti piani **fattoriali frazionati ortogonali**

Disegno ridotto e precisione delle stime dei part worths

Come ricavare il piano fattoriale?

- I piani fattoriali frazionati ortogonali sono ottenibili "a mano" per prodotti del tipo 2^k (k attributi, ciascuno con due livelli) quando k è piccolo (minore di 5)
- In tutti gli altri casi è necessario utilizzare un opportuno software
 - MINITAB
 - SPSS
 - SAS

Come trattare l'insieme dei rispondenti?

- In generale non è possibile sviluppare un prodotto per ciascun rispondente
- È necessario stimare il modello su un gruppo omogeneo di rispondenti

Cosa succede al part worth model?

- Dal p.d.v. statistico, la necessità di avere più rispondenti non crea nessuna ulteriore complicazione al part worth model
 - Il numero di righe del vettore utilità (y), della matrice delle variabili dummy (X) e del vettore degli errori aumenta da n a $m \times n$, dove n = numero di prodotti appartenenti al piano fattoriale considerato, m = numero di rispondenti che vengono aggregati
- La stima del modello è del tutto identica al caso del rispondente singolo (minimi quadrati)
- Si noti che il vettore dei part worth ha ancora dimensione k , dove k = di tutti i livelli (nel caso del diaper, $k=5$)

Esempio: diaper con 2 rispondenti

$$\begin{matrix} \text{Rispondente 1} \\ Y_{11} \\ Y_{21} \\ Y_{31} \\ Y_{41} \\ Y_{51} \\ Y_{61} \\ Y_{12} \\ Y_{22} \\ Y_{32} \\ Y_{42} \\ Y_{52} \\ Y_{62} \end{matrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} w_{11} \\ w_{12} \\ w_{13} \\ w_{21} \\ w_{22} \end{matrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{21} \\ \varepsilon_{31} \\ \varepsilon_{41} \\ \varepsilon_{51} \\ \varepsilon_{61} \\ \varepsilon_{12} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{31} \\ \varepsilon_{42} \\ \varepsilon_{52} \\ \varepsilon_{62} \end{bmatrix}$$

In generale, con n rispondenti, la matrice delle variabili dummy ha $m = n \cdot \lambda_i$ righe e $\sum \lambda_i$ colonne

Cosa succede dal p.d.v. gestionale?

- Il modello fornisce tendenze centrali per i valori dei coefficienti di utilità parziale (e per le utilità totali dei prodotti appartenenti al piano completo)
- I valori osservati empiricamente si dispongono attorno alla tendenza centrale
- L'ampiezza della dispersione deve essere ridotta e deve poter essere attribuita con ragionevole certezza a motivazioni casuali
 - Tipicamente si esamina il vettore degli errori
 - piccoli (s.e. < 2.0 è ok)
 - Distribuiti normalmente con media 0

La spazzola da tappeto Green & Wind (1973)

- Un'azienda sta sviluppando una nuova spazzola per pulire i tappeti
- L'azienda ha identificato cinque attributi rilevanti per il prodotto
 - Package
 - Brand
 - Prezzo
 - Garanzia
 - Certificazione

I concetti alternativi

- I livelli per gli attributi rilevanti sono riassunte nella tabella
- Il numero di prodotti possibili è pari a: $3 \times 3 \times 3 \times 2 \times 2 = 108$
- È necessario sviluppare il piano ortogonale frazionato

Attributo	Descrizione	Livelli
Package	Design del package	A*, B*, C*
Brand	Brand name	K2R, Glory, Bisse!
Prezzo	Prezzo	\$1.19, \$1.39, \$1.59
Sigillo	Certificazione Gold Housekeeping	Si, No
Money	Garanzia Soddisfatti o rimborsati	Si, No

Opzioni nella generazione del piano fattoriale

- **Minimum number of cases:** per aumentare l'affidabilità delle stime dei parametri si può incrementare il numero di casi sottoposti a misurazione empirica
- **Holdouts cases:** Non sono utilizzati per stimare il modello, bensì per verificare la bontà della stima.
 - Si calcola l'utilità dei prodotti di holdout a partire dal modello stimato sul piano fattoriale
 - Si calcola la correlazione tra l'utilità stimata e la risposta dell'intervistato

Specificazione dei fattori

- DISCRETE = non si sa nulla oppure è possibile qualsiasi tipo di part worth
- LINEAR = il part worth è lineare
 - LESS = decrescente
 - MORE = crescente
- IDEAL e ANTIIDEAL = u-shape

Come calcolare l'importanza relativa degli attributi?

- Importanza dell'i-esimo attributo =
$$\frac{\text{range utilità dei livelli relativi all'i-esimo attributo}}{\text{range livelli utilità primo attributo} + \dots + \text{range livelli utilità n-esimo attributo}}$$

Calcolo dell'importanza relativa

Il significato degli indici di correlazione R e K

- I due valori di utilità devono essere fortemente correlati, altrimenti il modello part worth non regge ed è necessario adottare modelli più sofisticati
- Deve essere almeno Significance < 0.05

L'utilizzo dei casi di holdout

- Poiché il numero di profili è generalmente di poco superiore al numero di parametri, i valori dei coefficienti di correlazione e della Significance sono spesso imprecisi
- Il valore di correlazione con i casi di holdout dà un'indicazione maggiormente precisa del buon funzionamento del modello
- In questo caso deve essere Significance < 0.05 o Significance < 0.1, con un coefficiente superiore a .3-.4

Come si calcola l'utilità?

- ? Utilità del prodotto:
 - Package B*
 - Brand K2R
 - Price \$1.19
 - Seal No
 - Money back warranty No

$$(-.6667)+(-1,3333)+(,4167)+(9,000)+(5,000)-10,000=$$
$$= \mathbf{4,47}$$

Simulation Summary

- Probabilità che il rispondente scelga un determinato profilo di simulazione all'atto dell'acquisto, posto che debba scegliere tra i profili di simulazione
- Tre indici
 - Maximum utility model: utilità profilo/utilità del miglior prodotto possibile
 - BTL (Bradley-Terry-Luce) model: utilità del profilo/ somma utilità dei profili
 - Logit Model: $\ln(\text{utilità profilo}) / \ln(\text{somma utilità})$

Pericoli dell'aggregazione

- Aggregare rispondenti estremamente eterogenei porta ad avere informazioni fallaci
 - Il prodotto non soddisfa nessuno
- È opportuno definire gruppi omogenei di rispondenti mediante:
 - L'osservazione dell'andamento delle curve di utilità per identificare pattern simili
 - L'utilizzo di variabili di stratificazione
 - L'utilizzo di tecniche statistiche (e.g. cluster analysis K-means etc.)

Un caso reale

Un caso reale

...è necessaria la clusterizzazione...

... e la descrizione dei gruppi

- 1 "EIB tradizionale"
 - utente non deve interagire / interferire eccessivamente con l'impianto
 - lasciandone il compito ad addetti appositi
 - ed essendo interessati prevalentemente a disporre di scatole interne
- 2 "innovazione, ma con scatola interna"
 - interessati alla estraibilità della scatola portafrutti
 - interessati alla riprogrammabilità del sistema,
 - rimane piuttosto netta la preferenza per una scatola interna
- 3 "flessibilità per gli addetti all'impianto"
 - soggetti di estrazione prevalentemente tecnica
 - avere tutti i montanti predisposti per l'alloggiamento della scatola
 - estraibilità del frutto solo da tecnico specializzato
- 4 "massima innovazione"
 - 1 molto interessato a tutte le opzioni di riconfigurabilità
 - 2 sempre preferenza molto forte per la scatola interna

Esempio in SPSS

- Servizio mensa presso la Facoltà di Ingegneria Gestionale, Vicenza
- Attributi e livelli

Attributi	Livelli		
	Bassa	Media	Alta
Qualità			
Prezzo	2,5€	3,5€	4,5€
Pasto ridotto	Si	No	-
Attesa massima	10 min	20 min	30 min

Analisi dei cluster

Analisi dei cluster

Progettazione dello studio

- Variabili di classificazione
 - Determinazione degli attributi
 - Rappresentazione dello stimolo
 - Full Profile
 - Partial Profile
 - Tipo di risposta richiesta all'intervistato
 - Rating
 - Ranking
 - Confronto a coppie
 - Desiderability ranking
 - Criterion
 - Preferenza
 - Intenzione di acquisto
 - Approccio all'analisi dei dati
 - Traditional
 - ACA
 - Choice based

Determinazione degli attributi

- Individuazione degli attributi
 - Rilevanti per il consumatore
 - Per i quali esistono diversi livelli possibili
- Inclusione di un attributo poco importante
 - Viene evidenziato nei risultati
 - Aumenta inutilmente il numero di prodotti possibili e il numero di domande necessarie alla stima del modello
- Esclusione di un attributo molto importante
 - Non vi è modo di evidenziarlo dall'analisi
 - Le conclusioni possono non essere affidabili

E' NECESSARIA UNA FASE DI MESSA A PUNTO E VALIDAZIONE DELL'ESPERIMENTO DI CA

Classificazione P&G

- Physical attributes
 - Riferiti ai prodotti in sé
 - Disposizione degli elastici che chiudono il pannolino sulle gambe
 - Materiale utilizzato per il rivestimento esterno
- Performance benefits
 - Riferiti alle prestazioni del prodotto
 - Baby dryness
 - Facilità di apertura/chiusura
- Psychological positioning
 - Riferiti all'utilizzatore
 - Brand
 - Colore/decorazione del rivestimento

Stimulus representation

- Full profile
 - Descrizione completa dell'alternativa di prodotto
- Partial profile
 - Descrizione dell'alternativa di prodotto utilizzando un numero ridotto di attributi
- L'approccio full profile simula bene la situazione di mercato. Nel caso di prodotti particolarmente complessi tende all'information overloading del rispondente, con conseguente scarsa affidabilità delle risposte
- L'approccio partial profile è adatto anche a prodotto particolarmente complessi, ma richiede tecniche di stima più complicate (e.g. ACA)

Come trattare l'insieme dei rispondenti?

- In generale non è possibile sviluppare un prodotto per ciascun rispondente
- È necessario stimare il modello su un gruppo omogeneo di rispondenti

Progettazione dello studio

- Variabili di classificazione
 - Determinazione degli attributi
 - Rappresentazione dello stimolo
 - Full Profile
 - Partial Profile
 - Tipo di risposta richiesta all'intervistato
 - Rating
 - Ranking
 - Confronto a coppie
 - Desiderability ranking
 - Criterion
 - Preferenza
 - Intenzione di acquisto
 - Approccio all'analisi dei dati
 - Traditional
 - ACA
 - Choice based

Determinazione degli attributi

- Individuazione degli attributi
 - Rilevanti per il consumatore
 - Per i quali esistono diversi livelli possibili
- Inclusione di un attributo poco importante
 - Viene evidenziato nei risultati
 - Aumenta inutilmente il numero di prodotti possibili e il numero di domande necessarie alla stima del modello
- Esclusione di un attributo molto importante
 - Non vi è modo di evidenziarlo dall'analisi
 - Le conclusioni possono non essere affidabili

E' NECESSARIA UNA FASE DI MESSA A PUNTO E VALIDAZIONE DELL'ESPERIMENTO DI CA

Classificazione P&G

- Physical attributes
 - Riferiti ai prodotti in sé
 - Disposizione degli elastici che chiudono il pannolino sulle gambe
 - Materiale utilizzato per il rivestimento esterno
- Performance benefits
 - Riferiti alle prestazioni del prodotto
 - Baby dryness
 - Facilità di apertura/chiusura
- Psychological positioning
 - Riferiti all'utilizzatore
 - Brand
 - Colore/decorazione del rivestimento

Stimulus representation

- Full profile
 - Descrizione completa dell'alternativa di prodotto
- Partial profile
 - Descrizione dell'alternativa di prodotto utilizzando un numero ridotto di attributi
- L'approccio full profile simula bene la situazione di mercato. Nel caso di prodotti particolarmente complessi tende all'information overloading del rispondente, con conseguente scarsa affidabilità delle risposte
- L'approccio partial profile è adatto anche a prodotto particolarmente complessi, ma richiede tecniche di stima più complitate (e.g.ACA)

Tipo di risposta

- Scoring: assegnare un numero appartenente ad un intervallo (e.g. 1-10) oppure ad una scala Likert (e.g. 1-5, 1-7, 1-9, 0-10) in funzione dell'utilità del profilo presentato
- Ranking: ordinare i profili in funzione dell'utilità
- Paired comparison: confrontare tutte le possibili coppie di profili di prodotto, scegliendo tra i due quello preferito
 - Questo metodo produce un ranking. Il ranking infatti consiste nel confrontare le $n(n-1)/2$ possibili a partire da n profili di prodotto
 - È opportuno considerare che nel caso di risposta ranking e paired comparison si ha una risposta non metrica
 - Per poter utilizzare il modello part worth è necessario effettuare uno scoring con tecniche maggiormente avanzate (ALSOS, TRANSREG, MORALS e tutte le tecniche basate sulla trasformazione monotona di Kruskal) oppure utilizzare altri approcci per la stima dei modelli (LINMAP, MONANOVA)

Criterion

- Questo aspetto riguarda la formulazione della domanda ed è probabilmente il più importante al fine di interpretare i risultati
- La domanda può essere formulata in termini di
 - Preferenza
 - Intenzione di acquisto
- Esempio
 - Quale preferisci tra i seguenti due prodotti?
 - Quale tra i seguenti prodotti acquisteresti con maggiore probabilità?

Brand: Ferrari		Brand: Ford
Motore: 12 cilindri	v.s.	Motore: 4 cilindri
Prezzo: 100.000€		Prezzo: 15.000€

LA SCELTA DIPENDE DALL'OBIETTIVO DELLO STUDIO

Cosa si può fare con i risultati?

- Analisi sul singolo rispondente
- Analisi aggregate
- Individuazione dei segmenti di mercato
- Simulazioni di mercato e previsioni di vendita

I due tipi di CA

Traditional Conjoint Analysis (full profile)

- La singola preferenza espressa dal rispondente riguarda tutti gli attributi considerati
- L'insieme delle preferenze riguarda
 - Tutte le possibili combinazioni di livelli per gli attributi considerati (piano fattoriale completo)
oppure
 - Un sottoinsieme di tutte le possibili combinazioni dei livelli per ciascun attributo (piano fattoriale frazionato)

Limiti della C.A. classica

- Il Full Profile è poco gestibile non appena aumenta il numero di attributi e livelli
- Il numero di domande da porre è generalmente elevato, anche nel caso in cui si impieghino piani frazionati
 - Ad esempio, con 12 attributi ciascuno con 4 livelli, si devono porre almeno $12 \times 4 - 12 = 12 \times 3 = 36$ domande (rating o ranking)
- Si consideri che non 12 attributi ciascuno con quattro livelli è un caso assolutamente possibile

I due tipi di CA

Adaptative Conjoint Analysis

- La singola preferenza riguarda un confronto tra sottoinsiemi degli attributi considerati
- Gli attributi comparati nella n-esima preferenza dipendono dagli attributi comparati nella (n-1)-esima preferenza e dalla risposta data

Come funziona (a grandi linee) l'ACA?

- La raccolta di informazioni avviene in due fasi
- La prima fase è finalizzata a stabilire, per ciascun rispondente, un ordinamento per i livelli di ciascun attributo in base alla loro utilità, se non specificata a priori dall'analista

Ad esempio:

$U(\text{elastico}) > U(\text{no elastico})$

$U(\$5) > U(\$6) > U(\$7)$

ACA, prima fase

- Domande tipiche per la prima fase:

Si supponga di poter acquistare un pannolino usa e getta per bambini. A parità di tutte le altre caratteristiche, quale si preferisce?

- a) quello con elastico
- b) quello senza elastico

ACA, prima fase

Si supponga di poter acquistare un pannolino usa e getta per bambini. A parità di tutte le altre caratteristiche, quale si preferisce?

- A) quello prezzato \$5
- B) quello prezzato \$6

- A) quello prezzato \$6
- B) quello prezzato \$7

- A) quello prezzato \$5
- B) quello prezzato \$7

Risultati della prima fase

- Si suppongano le seguenti risultanze relativamente alle preferenze di un rispondente
presenza elastico > assenza elastico
\$5 > \$6 > \$7

Seconda fase

- Si considerano, per ciascun attributo, i livelli estremi dell'ordinamento
 - Elastico: Yes, No
 - Prezzo: \$5, \$7
- Si chiede al rispondente di valutare l'importanza della differenza tra i livelli
 - Quanto è importante su una scala 1-4 che il prodotto, a parità di tutto il resto, presenti:
 - Un prezzo di \$5 invece che di \$7: 1 2 3 4
 - L'elastico invece che esserne privo: 1 2 3 4

Come vengono utilizzati i dati della prima fase?

- È possibile definire una scalatura numerica dei livelli per ciascun attributo
- Le regole da seguire
 - Assegnare un intero progressivo, partendo da 1, a ciascun attributo secondo l'ordine di preferenza
 - \$5->1
 - \$6->2
 - \$7->3
 - YES->1
 - NO->2

Le regole (2)

- Invertire l'ordine di preferenza relativo ai livelli di ciascun attributo
 - Per il prezzo
 - ORDINAMENTO: \$5->1, \$6->2, \$7->3
 - ORDINAMENTO INVERTITO: \$7->1, \$6->2, \$5->3
 - Per l'elastico
 - ORDINAMENTO: YES->1, NO->2
 - ORDINAMENTO INVERTITO: NO->1, YES->2

Le regole (3)

- Sottrarre la media ai valori di ciascun livello
 - Prezzo: $(1+2+3)/3=6/3=2$
 - \$5: $3-2=1$
 - \$6: $2-2=0$
 - \$7: $1-2=-1$
 - Elastico: $(1+2)/2=1.5$
 - YES: $2-1.5=0.5$
 - NO: $1-1.5=-0.5$

Le regole (4)

- Riscalare i valori in modo da avere, per ciascun attributo, un range di variazione unitario
 - Prezzo:
 - \$5-> 0.5
 - \$6-> 0
 - \$7-> -0.5
 - Elastico: è già ok

Le regole (5)

- Moltiplicare i valori assegnati ai livelli per l'importanza dell'attributo [0,4]
 - Prezzo:
 - \$5: $0.5 \times 2 = 1$
 - \$6: $0 \times 2 = 0$
 - \$7: $-0.5 \times 2 = -1$
 - Elastico
 - YES: $0.5 \times 4 = 2$
 - NO: $0.5 \times 4 = -2$

È ora possibile calcolare la matrice degli scoring

- Con i dati ottenuti è possibile calcolare, secondo un'approccio compositivo di tipo self explicated, l'utilità di ciascun profilo di prodotto

	\$5	\$6	\$7
YES	$2+1=3$	$2+0=2$	$2-1=1$
NO	$-2+1=-1$	$-2+0=-2$	$-2-1=-3$

...e, di conseguenza, stimare i part worth

- È di conseguenza possibile stimare le utilità parziali mediante il modello di regressione (part worth model)

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_{11} \\ w_{12} \\ w_{13} \\ w_{21} \\ w_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \\ e_5 \\ e_6 \end{bmatrix}$$

1 0 0 1 0
0 1 0 1 0
0 0 1 1 0

La matrice permette di stimare il part worth model

- L'approccio utilizzato per la stima è sia compositivo che decompositivo
- Le risposte di tipo self-explicated permettono di stimare le utilità di tutte le configurazioni di prodotto
- A partire dalle configurazioni si stimano i part worth mediante il modello di regressione

Terza fase (fase adattativa)

- Come osservato in precedenza, si ottengono informazioni quando il rispondente è indotto a considerare i trade off
- Nella ACA si considera ad ogni iterazione la matrice di scoring e si individuano i prodotti con l'utilità più bassa in valore assoluto e più simile
 - YES+\$7
 - NO + \$5

La domanda posta

- Dovendo scegliere tra i seguenti due prodotti, uguali tranne che per le caratteristiche evidenziate, quale sceglierebbe?

La risposta permette di specificare ulteriormente il modello

- La risposta permette di aggiornare la matrice dei part worth stimando nuovamente il modello

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \\ -2 \\ -3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_{11} \\ w_{12} \\ w_{13} \\ w_{21} \\ w_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \\ e_5 \\ e_6 \\ e_7 \end{bmatrix}$$

Cosa contiene la riga aggiunta?

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \\ -2 \\ -3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_{11} \\ w_{12} \\ w_{13} \\ w_{21} \\ w_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \\ e_5 \\ e_6 \\ e_7 \end{bmatrix}$$

- 4: forte preferenza a sx
- 2: preferenza a sx
- 0: indifferenza
- 2: preferenza a dx
- 4: forte preferenza a dx

Configurazione dei prodotti confrontati con il segno
(-) Se a sx, (+) se a dx

Le iterazioni successive...

- Dopo aver stimato nuovamente i w_i , si ricalcolano nuovamente le utilità di tutti i profili di prodotto e quindi la matrice degli scoring
- La domanda successiva posta al rispondente prevede il confronto tra la coppia di prodotti con l'utilità più simile e più bassa nella nuova matrice degli scoring
- Si procede finché: [wi stimato alla k-esima iterazione]-[wi stimato alla (k+1)-esima iterazione] è maggiore di un valore (opportunamente piccolo) prefissato

Cosa portarsi via

- Definizione del problema, i.e. perché è importante il concept testing
- Quali sono gli obiettivi
- Quali sono i due possibili approcci
- Cosa sono i self-explicated models e come "funzionano" (cioè: quali sono i passi da seguire)
- Cosa sono i modelli decompositivi
- Come calcolare le utilità parziali partendo dal ranking mediante la matrice per prodotti semplici
- Che cos'è la conjoint analysis: i tre elementi della definizione
- Che cos'è il part worth model
- Quanti sono i possibili prodotti dati gli attributi e i livelli, quante osservazioni almeno sono necessarie per stimare il part worth model e perché servono più osservazioni
- Cos'è un piano fattoriale, un piano fattoriale frazionato, un piano fattoriale frazionato ortogonale e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di ciascuno
- Come vengono trattati i diversi rispondenti: conseguenze per il part worth model, cluster analysis e pericoli
- Cosa si intende con analisi full-profile e analisi partial profile
- Cos'è l'ACA, quali sono gli approcci seguiti e i passi dell'analisi