

**Principio di induzione . Coefficienti binomiali. Serie geometrica.**

a) **Principio di induzione infinito-numerabile o principio di Peano.** “Se la proprietà P è vera per  $k \in \mathbb{N}$  e se, essendo vera per n, è vera per n+1, allora P è vera per ogni  $n > k$ . (k può essere zero).  $[P(k) \wedge P(n) \Rightarrow P(n+1)] \Rightarrow [(\forall n > k) P(n)]$ .

**Esempi.**

1) Dimostrare che  $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$  .

2)  $1^2+2^2+3^2+\dots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$  .

3)  $1^3+2^3+3^3+\dots+n^3 = (1+2+3+\dots+n)^2$ .

4) *Ragionamento del tacchino.* Sembra che se al prodotto dei primi n numeri primi si sommi 1, si ottenga ancora un numero primo. Verificare che ciò è vero per n=1, n=2, n=3, n=4:

Per n=1, 2+1=3: primo;

per n=2, 2.3+1=6+1=7: primo;

per n=3, 2.3.5+1=30+1=31: primo;

per n=4, 2.3.5.7+1=210+1=211: primo.

Ce la sentiremmo di concludere che la proprietà è vera per ogni n? Il tacchino direbbe di sì; e voi?

Se per n=4 fossimo giunti a una conclusione falsa, la proprietà sarebbe falsa, ma ora come facciamo? Non credo che qui si possa applicare il principio di Peano. **La proposizione precedente è falsa:** verificare che **2.3.5.7.11.13+1 è composto**).

Del resto, ci sono proposizioni aritmetiche molto semplici da enunciare, che, a tutt’oggi, sono indecise ( e forse indecidibili): (a) ogni numero pari è somma di due numeri primi?, (b) esistono infinite coppie di numeri primi *gemelli*? (numeri primi la cui differenza è 2, come 5 e 7, 11 e 13, 17 e 19), esistono o non esistono numeri *perfetti* dispari? (un numero si dice perfetto se è somma di tutti i suoi divisori, 1 incluso, come 6, 28,...),....

**Alcune proposizioni aritmetiche**, altrettanto semplici da enunciare, sono state dimostrate con mezzi matematici elevati. (a) ogni numero naturale è somma, al più, di quattro quadrati (Poincaré, fine del XIX° secolo), (b) l’equazione *pitagorica*  $x^n+y^n=z^n$  non ammette soluzione con terne x,y,z di numeri naturali, se  $n > 2$ . (**Fermat XXVII secolo, Andrew Wiles 1995**).

5) Il principio di induzione di Peano serve a confermare (o a rigettare) una proprietà ipotizzata, ma non ci dice nulla sul modo di arrivare a quella proprietà. Una via per arrivare alla 1) è la seguente:

$S=1+ 2+ 3+\dots +(n-2)+(n-1)+n$  ; per la proprietà commutativa si può scrivere:

$S=n+ (n-1)+ (n-2)+\dots + 3+ 2+ 1$  , per cui, sommando,  $2S=(1+n).n$  , donde la tesi.

Verificare che la 2) si ricava sommando i cubi di (0+1), (1+1), (2+1), (n+1) e utilizzando la 1).

Analogamente la 3) si ricava sommando le quarte potenze e utilizzando la 2) e la 1).

6) Verificare o rigettare la seguente formula:  $1^4+2^4+\dots+n^4 = n^4.(n-1)+1$ .

7) Calcolare i seguenti limiti per  $n \rightarrow \infty$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\dots+n}{n^2}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2+2^2+\dots+n^2}{n^3}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^3+2^3+\dots+n^3}{n^4} .$$

**N.B.** Applicare le formule precedenti e poi il **Teorema di Paperone** : Se  $n \rightarrow \infty$ , gli **Infiniti** di grado minore sono trascurabili rispetto a quelli di grado maggiore (es.  $\lim_{n \rightarrow \infty} (9n^2 + 151n^3 - n^4) = -\infty$ ), che a

sua volta discende dal **teorema di Paperino** :  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8\text{miliardi}}{n} = 0$  .

8) Per  $n \rightarrow \infty$  i limiti dei quozienti sono facili. Calcolare ora i seguenti limiti:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( n + \sqrt{n^2 - 8n + 1} \right), \lim_{n \rightarrow \infty} \left( n - \sqrt{n^2 + 16} \right), \lim_{n \rightarrow \infty} \left( n - \sqrt{n^2 + 3n + 16} \right), \lim_{n \rightarrow \infty} \left( n - \sqrt[3]{n^4 - 13n^3 - 16n} \right).$$

**b) Calcolo combinatorio e coefficienti binomiali.**

1) Disposizioni (semplici) di n oggetti di classe k (a k a k): sono le sequenze ordinate di k oggetti distinti scelti da un insieme di n oggetti. Il loro numero è  $D_{n,k} = n(n-1)(n-2) \dots (n-k+1)$ ,  $k \leq n$ .

Disposizioni con ripetizione (un oggetto può essere ripetuto). Il loro numero è  $D_{n,k}^r = n^k$ . **Questa volta k può superare n.**

Esempi:  $D_{3,2} = 3 \cdot 2 = 6$ ; infatti sia  $\{a,b,c\}$  l'insieme di 3 oggetti e prendiamoli a 2 a 2 : (a,b), (a,c), (b,a), (b,c), (c,a), (c,b). Invece le disposizioni con ripetizione sono  $3^2 = 9$ , perché, oltre alle precedenti, ci sono le disposizioni *ripetute* (a,a), (b,b), (c,c).

In generale, due disposizioni si considerano diverse se differiscono per l'ordine o per almeno un elemento.

Se  $k = n$ , le disposizioni semplici sono  $D_{n,n} = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!$  (Permutazioni  $P_n$  di n oggetti).

2) Combinazioni semplici di n oggetti di classe k sono i sottoinsiemi di k oggetti ciascuno da un insieme di n oggetti. (l'ordine non conta). Permutando in ciascun sottoinsieme i k oggetti, si ottengono le disposizioni, perciò  $k! \cdot C_{n,k} = D_{n,k}$  da cui

$$[1] C_{n,k} = \frac{D_{n,k}}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}. \text{ Si osservi la proprietà di simmetria } C_{n,k} = C_{n,n-k}.$$

Siccome  $C_{n,n} = 1$ , volendo che la [1] sia sempre valida, occorre porre  $C_{n,0} = 1$  e di conseguenza  $0! = 1$ .

I coefficienti  $C_{n,k}$  si indicano anche con  $\binom{n}{k}$  e si chiamano coefficienti binomiali.

Combinazioni con ripetizione  $C_{n,k}^r = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}$ . (Dimostrarlo è complicato).

**Esercizio**, Dimostrare la relazione  $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$  (Formula di Tartaglia).

**Applicazione allo sviluppo del binomio:**

$$(a+b)^n = (a+b)(a+b) \dots (a+b) = a^n + na^{n-1}b + n(n-1)/2 \cdot a^{n-2}b^2 + \dots + nab^{n-1} + b^n.$$

I coefficienti numerici delle potenze di a e di b sono i coefficienti binomiali e perciò

$$[2] (a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

**Nota.** Si pone  $0! = 1$ ; sapreste dire perché? Questa fa il paio con  $a^0 = 1$ .

**c) Progressione e serie geometrica.**

Sia data la successione di numeri reali  $a_1, a_2, \dots, a_k, a_{k+1}, \dots, a_n$ , con  $a_{k+1} = q \cdot a_k$ . Segue che

$$[1] a_n = a_1 \cdot q^{n-1}.$$

1) Verificare che, se  $q \neq 1$ , posto  $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$  (*sommatoria*), risulta

$$[2], S_n = a_1 \frac{1-q^n}{1-q}. \text{ (Fare } S_n - q \cdot S_n \text{ e utilizzare la [1]. Somma di una progressione geometrica).}$$

In particolare, se  $|q| < 1$ ,

$$[3] \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S = a_1 \frac{1}{1-q}.$$

Per esempio, per  $q=1/2$  (e  $a_1=1$ ),  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 2$ , per  $q=1/3$ ,  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^n} = \frac{3}{2}$ .

La [3] si può giustificare per via cinematica (si pensi ad Achille e alla tartaruga).

2) Si dimostra che, se  $\alpha > 1$ , la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$  è convergente, cioè il suo limite è finito. (Si può

dimostrare per confronto con un integrale improprio o in altri modi). Verifichiamo ora in modo elementare che, se  $\alpha=1$ , la serie (detta armonica) diverge positivamente (tende a  $+\infty$ ).

Infatti,  $1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6+1/7+1/8+\dots=1+1/2+(1/3+1/4)+(1/5+1/6+1/7+1/8)+\dots$  poi si associno 8 addendi, poi 16, poi 32 e così via e si osservi che in ogni parentesi la somma degli addendi supera  $1/2$ ; perciò la somma della serie armonica supera la somma di infiniti addendi uguali a  $1/2$  ed è perciò infinita. A maggior ragione, se  $\alpha < 1$ , la serie diverge positivamente.

3) Verificare che la serie  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$  è convergente. (Confrontare con una serie geometrica opportuna).

4) Verificare che la serie  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\text{Log}_2(n)}$  diverge (a  $+\infty$ ). (i logaritmi sono in base 2).

5) Che fa la serie  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\text{Log}_{\frac{1}{2}}(n)}$ ? (logaritmi in base  $1/2$ ).